

HPV est
l'abréviation de
« papillomavirus
humains »

Ces virus sont très répandus.

L'infection sexuellement transmissible par les virus HPV est l'infection la plus répandue en Suisse et partout dans le monde.

80%



Tôt ou tard, presque chaque individu est infecté par un HPV au cours de sa vie.

Les HPV se transmettent par contact cutané génital, généralement sexuel.




La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont infectés par les HPV et peuvent donc transmettre les HPV à d'autres personnes sans le savoir.

Actuellement, plus de 200 types différents de HPV sont connus.




La plupart des infections par les HPV ne provoquent aucun symptôme et disparaissent d'elles-mêmes.

Certains "types de HPV" peuvent provoquer des verrues génitales.



Il est possible que les verrues génitales guérissent d'elles-mêmes, mais cela peut prendre quelques années.

Les "types de HPV à haut risque" peuvent provoquer des stades précancéreux et des cancers.



Cancers de la tête et du cou

Cancers de la tête et du cou

Cancer du pénis

Cancer du col de l'utérus

Verrues génitales

Cancer du vagin

Cancer de l'anus

Cancer de la vulve

Verrues génitales

Cancer de l'anus

Les HPV sont surtout connus pour provoquer le cancer du col de l'utérus, mais ils peuvent également causer d'autres cancers et maladies.

Les maladies liées aux HPV sont fréquentes en Suisse :



Nouveaux cas par an

- 25 000** Verrues génitales
- 5 000** Lésions précancéreuses du col de l'utérus à un stade avancé
- 3 000** Conisations liées aux HPV (peuvent entraîner des fausses couches et des naissances prématurées)
- 250** Cancers du col de l'utérus (avec suite de traitement)
- 160** Cancers de l'anus (femmes et hommes)

Cas de décès par an

- 80** Cancers du col de l'utérus
- 40** Cancers de l'anus (femmes et hommes)



Un dépistage régulier est uniquement réalisé pour le cancer du col de l'utérus, mais pas pour les autres cancers liés aux HPV. En général, on les découvre lorsqu'ils entraînent un problème de santé.

La vaccination protège des infections à HPV pouvant entraîner différents types de cancers et de verrues génitales.



Réduction du risque de cancer invasif du col de l'utérus

Âge de la vaccination:
<17 ans

88%



Âge de la vaccination:
17-30 ans

53%



**2 doses de vaccin HPV
jusqu'à l'âge de 14 ans**



**3 doses de vaccin
HPV dès 15 ans**

Questions fréquemment posées sur les HPV:

Je suis un garçon - pourquoi devrais-je me faire vacciner contre les HPV ?

Les hommes peuvent également être touchés par des maladies et des verrues génitales liées aux HPV. En agissant ainsi, tu peux également protéger ton/ta partenaire.

Ai-je l'âge de me faire vacciner ?

Il est préférable de se faire vacciner le plus tôt possible, c'est-à-dire dès l'âge de 11 ans, car on n'a pas encore été infecté et le corps réagit mieux à la vaccination. Si tu te vaccines avant l'âge de 15 ans, tu n'as besoin que de deux vaccins au lieu de trois.

À quel endroit du corps dois-je recevoir le vaccin et est-ce que cela fait mal ?

C'est juste une piqûre dans le haut du bras. C'est la même chose que les vaccins que tu as reçus jusqu'à présent.

Puis-je contracter les HPV à cause du vaccin?

Non. Le vaccin contient des particules qui imitent les HPV, mais ce ne sont pas des virus vivants et ils ne peuvent pas causer d'infection.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin contre les HPV ?

En général, la vaccination est bien tolérée. Tu peux observer une rougeur ou un gonflement au niveau du site d'injection ou ressentir une douleur à cet endroit dans les jours qui suivent la vaccination contre les HPV. Parfois un état fébrile, des nausées, maux de tête ou fatigue peuvent apparaître.

**Les HPV nous concernent tous,
directement ou indirectement.**

**Découvrez comment t'en
protéger.**

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.hpv-info.ch

